



PDF generado el 1 de Abril del 2005

Los contenidos de este documento solo pueden ser utilizados bajo los principios de las Advertencias de uso que puede encontrar en www.vacunasaep.org/advertencias.htm

Inmunizaciones recomendadas en Adultos

VACUNA/TOXOIDE	PAUTA/VÍA ADMINISTRACIÓN	EDAD ACONSEJADA
Tdpa/Td*	- Primovacunación (Td): 3 dosis (0,1,6-12 meses). - Revacunación (Tdpa): 1 dosis cada 10 años. Vía Intramuscular	-Todos los adolescentes y adultos
Triple vírica (rubéola, sarampión y parotiditis)	1 dosis Vía Subcutánea	-Adultos jóvenes que no acrediten documentalmente haber recibido la vacuna o haber padecido las 3 enfermedades. -Todas las mujeres en edad fértil. Contactos no inmunizados, en las 72 horas pos exposición.
Gripe	Una dosis anual, preferiblemente entre septiembre y noviembre. Vía Intramuscular	- Adultos \geq 65 años -Menores de 65 años con patología crónica de base (cardiopatías, neumopatías, nefropatías, enfermedades neuromusculares, diabetes, hemoglobinopatías, inmunodeprimidos) con riesgo de sufrir complicaciones por la enfermedad. -Trabajadores de servicios públicos, sanitarios y urgencias. -Trabajadores y convivientes en centros de crónicos y con personas de alto riesgo. -Embarazadas en 2º-3º trimestre.

VACUNA/TOXOIDE	PAUTA/VÍA ADMINISTRACIÓN	EDAD ACONSEJADA
Neumococo 23-valente	1 dosis Revacunación: - 2ª dosis si la primera se aplicó antes de los 65 años y han pasado más de 5 años - a los 3 - 5 años en las personas de alto riesgo. Vía Intramuscular	-Adultos ≥ 65 años -Menores de 65 años con patología crónica (cardiopatías, neumopatías, hepatopatías, insuficiencia renal crónica y síndrome nefrótico, diabetes, asplenia anatómica o funcional, drepanocitosis, inmunodeficiencia congénita o adquirida y trasplantes).
Varicela	2 dosis (0,6-8 semanas) Vía Subcutánea	-Adolescentes y adultos susceptibles sin historia de varicela o con serología negativa -Mujeres susceptibles en edad fértil.
Hepatitis B	<u>Pauta habitual:</u> 3 dosis (0,1,6 meses) <u>Pauta acelerada:</u> 4 dosis (0,1,2,12 meses) No son necesarias dosis de recuerdo Vía Intramuscular	- Adultos de alto riesgo: contactos de individuos portadores del virus de la hepatitis B (HbsAg +), adictos a drogas por vía parenteral (ADVP), homosexuales y heterosexuales con múltiples parejas, personas en hemodiálisis, receptores de hemoderivados, personal sanitario y de seguridad que pueden contactar con sangre o fluidos biológicos, internos de instituciones penitenciarias, personal y residentes de instituciones para minusválidos psíquicos, viajeros de larga estancia en zonas endémicas y personas con infección por el virus de la hepatitis C
Hepatitis A	2 dosis (0,6-12 meses) Vía Intramuscular	-Personal sanitario y asistencial. -Manipuladores de alimentos. -Personal de laboratorio que manipula el virus de la Hepatitis A. -Viajeros a zonas endémicas. -Adictos a drogas por vía parenteral (ADVP). -Hemofílicos o receptores de hemoderivados. -Contactos de personas que padecen hepatitis A y en brotes. -Personas con hepatopatías crónicas.
Meningococo C conjugada	1 dosis Vía Intramuscular	-Personas con factores de riesgo (deficiencias de complemento o properdina, hipogammaglobulinemia o asplenia). -Contactos domiciliarios o sociales íntimos de enfermos con enfermedad invasora por meningococo C. -Viajeros con destino a países de alta endemicidad.
Haemophilus Influenzae conjugada	1 dosis Vía Intramuscular	-Personas con asplenia anatómica y funcional, neoplasia hematológica, inmunodeprimidos, HIV (+) y pacientes con deficiencias del complemento.

*Td: vacuna combinada de tétanos y difteria en dosis de adulto

*Tdpa: vacuna combinada de Tétanos, Difteria y tos ferina acelular en dosis de adulto, indicada como dosis de recuerdo cada 10 años.

Fuentes

Bayas JM, Vilella A. Vacunaciones del adulto. En: Salleras L. Vacunaciones Preventivas. Principios y aplicaciones. 2ª ed. Barcelona: Masson; 2003. p 849-66.

Farjas MP, Zubizarreta R, Louro A, Suarez B. Manual de vacunaciones del adulto. Teo: Ofelmaga SL, 2003.